GUSELKUMAB

Inforeuma.com

Fundación Española de Reumatología

¿QUÉ ES?

Guselkumab es un anticuerpo monoclonal IgG1λ humano que se une selectivamente a la proteína interleucina 23 (IL-23) con gran especificidad y afinidad. La IL-23, una citocina reguladora implicada en la inducciónde la enfermedad inflamatoria. Se ha demostrado en seres humanos que el bloqueo selectivo de la IL-23 normaliza la producción de citosinas proinflamatorias.
Se usa para el tratamiento de la artritis psoriásica y la psoriasis en placas moderada-grave que no ha respondido a terapias convencionales.

No debe usarse si…

-Presenta hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes.
-Infecciones activas o graves.

Consulte a su reumatólogo antes de usarlo si…

-Presenta una infección activa o crónica, antecedentes de infecciones recurrentes o factores de riesgo conocidos de infección.
-Tiene una infección por tuberculosis o contacto con personas con tuberculosis.
-Ha sufrido cualquier tipo de cáncer.
-Ha sido vacunado recientemente o va a ser vacunado durante el tratamiento. No le deben administrar vacunas con virus vivos mientras use guselkumab.
-Sigue algún otro tratamiento inmunosupresor o biológico.

Vigile la aparición de infecciones y reacciones alérgicas. Guselkumab puede ocasionar potencialmente efectos adversos graves, incluidas infecciones respiratorias y reacciones alérgicas. Debe vigilar la aparición de signos de estas enfermedades mientras use este medicamento. Interrumpa el tratamiento y avise a su reumatólogo o busque asistencia médica inmediatamente si nota alguno de los signos que indican una posible infección o reacción alérgica graves. Estos signos se incluyen en la sección "Posibles efectos adversos".

EMBARAZO, LACTANCIA Y FERTILIDAD

Es preferible que evite el uso de guselkumab durante el embarazo. Se desconoce el efecto de este medicamento en mujeres embarazadas. Si es una mujer en edad fértil, se aconseja que evite quedarse embarazada y debe utilizar un anticonceptivo adecuado mientras use guselkumab y hasta 12 semanas después. No hay datos sobre la fertilidad.

Consulte a su reumatólogo si…

-Está embarazada, cree que podría estar embarazada o tiene la intención de quedarse embarazada.
-Está dando el pecho o tiene previsto dar el pecho. Usted y su médico deben decidir si va a dar el pecho o va a utilizar guselkumab. No debe hacer las dos cosas.

COMÓ USARLO

El tratamiento debe ser iniciado y supervisado por un médico con experiencia en el tratamiento para los cuales está indicado.
La dosis recomendada es de 100 mg en inyección subcutánea en las semanas 0 y 4, seguida de una dosis de mantenimiento cada 8 semanas. Según el criterio clínico, en los pacientes con riesgo de daño articular elevado, se puede considerar una dosis de 100 mg cada 4 semanas
Usted y su reumatólogo deben decidir si ha de ser usted mismo quien se va a inyectar el fármaco. Lo importante es que no intente inyectarse el medicamento hasta que su reumatólogo o enfermero le hayan enseñado cómo hacerlo. La persona que lo cuida también puede ponerle la inyección después de haber recibido la formación oportuna.
Si recibe más fármaco del que debe o la dosis ha sido administrada antes del tiempo indicado por su reumatólogo, informe a su reumatólogo. Así mismo, si olvidó una dosis, hable con su

reumatólogo.
No es peligroso dejar de usar guselkumab pero si lo hace, es posible que reaparezcan los síntomas de su enfermedad. Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su reumatólogo.
Guselkumab es un tratamiento de larga duración

POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

Igual que el resto de medicamentos, guselkumab puede producir efectos adversos, aunque no es habitual.
Interrumpa el tratamiento con guselkumab e informe a su reumatólogo o busque inmediatamente asistencia médica si nota alguno de los siguientes efectos adversos:
-Posible infección grave: Los signos pueden incluir fiebre; síntomas gripales; sudores nocturnos; sensación de cansancio, dificultad para respirar o tos persistente; piel caliente, enrojecida y dolorosa a la palpación; erupción cutánea dolorosa con ampollas; ardor al orinar. La infección grave más frecuente es el herpes zóster.
-Reacción alérgica grave: Los signos pueden incluir dificultad para respirar o tragar; tensión arterial baja, que puede causar mareo o un ligero aturdimiento; hinchazón del rostro, labios o garganta; picor intenso de la piel acompañado de erupción o ampollas.
-Otros posibles efectos adversos:
Algunos efectos adversos son muy frecuentes (pueden afectar más de 1 de cada de 10 personas): Infección de vías respiratorias superiores.
Algunos efectos adversos son frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 10 personas): Diarrea, dolor de cabeza, dolor articular, aumento de las transaminasas y reacciones en el lugar de inyección.
Algunos efectos adversos son poco frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 100 personas): Infección por herpes simple o tiña, gastroenteritis, hipersensibilidad, anafilaxia, urticaria, erupción cutánea y disminución del recuento de neutrófilos.
Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su reumatólogo.

Fundación Española de Reumatología